

IL MERAVIGLIOSO MONDO DEGLI UCCELLI

“I PASSERIFORMI”

Quello dei passeriformi è il più vasto e complesso ordine di Uccelli che comprende oltre 5000 specie, cioè i 3/5 di tutte le specie di uccelli esistenti. La maggior parte delle specie di questo ordine ha dimensioni medio-piccole. Sono muniti di quattro dita, tre rivolte in avanti e uno, il pollice, rivolto all'indietro in modo da offrire una buona presa sui rami. I passeriformi sono tutti arboricoli o secondariamente terricoli; i pochi che vivono o prendono cibo in acqua non hanno zampe palmate. Di norma sono ottimi volatori. Il becco ha varia foggia, in relazione ai differenti regimi alimentari ed ai particolari adattamenti evolutivi: alcuni sono onnivori, altri granivori, altri si nutrono di invertebrati. Presenti in tutto il mondo, popolano gli ambienti più vari, tranne quello acquatico, fatta eccezione per il merlo acquaiolo. Moltissime specie sono apprezzate per il loro canto melodioso. Generalmente depongono 5-6 uova per cova, la cui durata è di circa 15 giorni. La prole è nuda e inetta, caratterizzata da una vistosa colorazione della cavità orale, che facilita ai genitori l'imbeccata del cibo.



Alauda arvensis (Allodola)



Em. San Marino 1-28-1960 - Ob. San Marino 1-28-1960.
1° G. Serie "Uccelli". Ediz. Kunstverlag - Esslingen.

Diffusione - Europa, Asia occidentale, Africa nordoccidentale.

Vita e abitudini - Nidifica sui rami degli alberi. Il nido a forma di coppa è costruito dalla coppia con radici, stecchi, muschio. Depone da 4-7 uova che sono incubate dalla femmina, nutrita dal maschio per un periodo di 12-14 giorni. I nidiacei, nidicoli, lasciano il nido dopo 13-15 giorni. Il cardellino depone due covate all'anno. Si nutre di semi, in particolare quelli del cardo, ma si nutre pure di insetti e invertebrati vari. Il maschio corteggia la femmina effettuando delle inclinazioni del corpo da un lato all'altro, tenendo le ali aperte e facendole rapidamente oscillare.

Em. Monaco 12-12-1962 - Ob. Monaco 12-12-1962. 1° G. Serie "Protezione degli uccelli". Ediz. Scienze naturali del Belgio.

CARDUELIS CARDUELIS

CARDELLINO

Ordine Passeriformi - Famiglia Fringillidi

Caratteristiche - Lungo sui 12 cm. Sessi simili. Colorazione vivace. Le parti superiori sono di un marrone fulvo, il groppone bianco, le parti inferiori marrone, le ali caratteristiche, nere barrate di giallo. La testa presenta una mascherina nera, bianca e rossa. I giovani hanno le parti superiori marrone-grigiastro e quelle inferiori più biancastre.

Ambiente - Boschi, parchi, giardini, pascoli, campi con cardo.

131. — Chardonneret élégant
Carduelis carduelis carduelis (L.)



CARDUELIS SPINUS (LUCHERINO)

Ordine Passeriformi - Famiglia Fringillidi



Em. Grecia 20-3-2014 - Ob. Aonivai 20-3-2014. ASI 1° G. Ediz. Sikin.

Caratteristiche - Lungo 11 cm. PESA 12-14 grammi. Il becco è corto e robusto. Nel maschio il piumaggio è di color giallo verde, con striature brune sui fianchi e il groppone giallo. La sommità del capo e il mento sono neri.

Ambiente - Giardini, terreni coltivati, boschi.

Diffusione - Europa, Asia centro-settentrionale.

Vita e abitudini - Il nido viene costruito sui rami. Depone una covata di 3-5 uova a intervalli di 1 giorno l'una dall'altra. L'incubazione viene effettuata dalla femmina per 11-14 giorni. I nidiacei, nidicoli, sono accuditi da entrambi i genitori per 13-15 giorni. Il cibo è costituito da semi di conifere, erbe.

CARDUELIS CANNABINA (FANELLO)

Ordine Passeriformi - Famiglia Fringillidi

Caratteristiche - Un individuo adulto può raggiungere i 13 cm. di lunghezza, peso circa 21 gr. Il colore della livrea va dal bruno del dorso al rosso vivo di fronte e petto, più evidente nei maschi. Il capo è grigio, le ali striate di bianco eccetto le remiganti.

Ambiente - Boschi radi con radura, vegetazione arbustiva.

Diffusione - Tutta l'Eurasia e nel Mediterraneo.

Vita e abitudini - Nidifica sui cespugli, deponendo 4-6 uova, per 2 covate all'anno. L'incubazione delle uova è di circa 13 giorni, e i pulcini sono pronti per l'involto dopo 13 giorni dalla schiusa. Il Fanello si nutre di semi, insetti.



Em. Grecia 20-3-2014 - Ob. Aonivai 20-3-2014. ASI 1° G. Ediz. Sikin.



PYRRHULA PYRRHULA

CIUFFOLOTTO

Ordine Passeriformi
Famiglia Fringillidi

Em. Finlandia 20-3-1991. Ob. Helsinki 3-2-1992. Serie "uccelli". Ediz. Aktion - Sempach. Validità Postale 31-12-2011.

Caratteristiche - Lungo sui 14,5 cm. Il maschio ha un piumaggio con le parti inferiori rosa, basso ventre e sottocoda bianchi e parti superiori nero grigiastro bluastra con groppone bianco. La testa è nero bluastra. La femmina presenta una colorazione più smorta, inferiormente brunastra con basso ventre e sottocoda bianchi.

Ambiente - Boschi, parchi, giardini.

Diffusione - Europa, Asia.

Vita e abitudini - Nidifica sugli alberi. Vi depone 4-5 uova, incubate per lo più dalla femmina per un periodo di 12-14 giorni. I nidiacei, nidicoli, restano nel nido per 12-18 giorni. Il Ciufofolotto depone una sola covata nei suoi areali di diffusione più settentrionali e orientali, ma anche due e persino tre altrove. Si nutre di germogli, gemme e semi. E' caratteristico il suo verso, che può essere rappresentato come un "teu-teu" lamentoso.

Em. Andorre 21-9-1974. Ob. La Vielle 21-9-1974. ASI 1° G. Serie "Conservazione della natura". Ediz. CEF - Nizza.



146. — **Bec-croisé perroquet**
Loxia pityopsittacus pityopsittacus Borkh.



LOXIA PYTYOPSITTACUS (CROCIERE DELLE PINETE)
 Ordine Passeriformi - Famiglia Fringillidi

Caratteristiche - Lungo Cm. 17. Il piumaggio del maschio è molto variabile e può spaziare da una colorazione gialla verdastria, con alcune penne rossastre, o interamente rosse. Le femmine sono verde-brunastre con il groppone verde. Ha un grosso becco e robusto, il capo massiccio.

Ambiente - Boschi di conifere.

Diffusione - Regioni più a Nord dell'Eurasia, penisola scandinava.

Vita e abitudini - Il nido viene costruito sugli alberi. L'unica covata annuale di 3-4 uova, è deposta in pieno inverno in coincidenza con il periodo di fruttificazione delle conifere. Le uova sono incubate dalla femmina per 13-16 giorni. I nidiacei, nidicoli, sono nutriti da entrambi i genitori, e volano all'età di 17-22 giorni. Si nutre di semi delle conifere (anche da insetti e bacche) che estrae dalle pigne grazie al becco.

Em. Monaco 12-12-1962 - Ob. Monaco 12-12-1962. 1° G. Serie "Protezione degli uccelli". Ediz. Patrimonio delle Scienze Naturali - Belgio.

PARUS CAERULEUS (CINCIARELLA)

Ordine Passeriformi - Famiglia Paridi.

Caratteristiche - Lunga circa 11,5 cm., presenta il vertice, la coda e le ali blu, le parti inferiori gialle, le guance bianche, l'occhio e la gola sono neri. Le parti superiori sono verdastre, con del giallastro sul groppone. Il becco è nero con la punta brunastra.

Ambiente - Boschi misti, parchi, giardini.

Diffusione - Europa, Asia minore e centro occidentale, Africa nordoccidentale.

Vita e abitudini - Nidifica nelle cavità degli alberi. Depone una covata di 7-12 uova, incubate dalla femmina per un periodo di 12-16 giorni. I nidiacei, nidicoli, sono allevati da entrambi i genitori e restano nel nido per 15-23 giorni. Si nutre di invertebrati, semi vari.

Em. Germania Repubblica Democratica 9-1-1979 - Ob. Berlino 9-1-1979. ASI 1° G. Serie "Uccelli canori nativi". Ediz. Jean Zeltner - Ginevra.



CARDINALIS CARDINALIS (CARDINALE ROSSO)
Ordine Passeriformi - Famiglia Fringillidi



Em. USA 10-6-1978 - Ob. Toronto 10-6-1978. 1° G. Serie "Capez".
Ediz. Nature Press - Alton.

Caratteristiche - Lungo cm. 18-22. Presenta una lunga cresta sul capo e un becco corto e conico. Il piumaggio è completamente color scarlatto tranne la gola e la base del becco.

Ambiente - Zone aperte e coltivate con alberi e cespugli.

Diffusione - America settentrionale e Isole Hawaii.

Vita e abitudini - Il nido viene costruito nei cespugli o sugli alberi. Depone 3-4 uova, incubate da entrambi i sessi. I nidiacei, lasciano il nido a 14 giorni d'età. Si nutre per gran parte di sostanze vegetali, di insetti, e altri invertebrati.

REGULUS REGULUS (REGOLO)
Ordine Passeriformi - Famiglia Silvini

Caratteristiche - Lungo sui 9 cm. le parti superiori del piumaggio presentano una colorazione verde oliva grigiastro, le parti inferiori sono grigiastro olivastre. La fronte è bruna, la cresta è gialla con il centro arancio.

Ambiente - Boschi di conifere e boschi misti, parchi.

Diffusione - Europa, Asia.

Vita e abitudini - Nidifica sugli alberi costruendo un nido rotondo fatto di sostanze vegetali, foglie, licheni. Depone 2 covate di 7-10 uova, incubate dalla femmina per 14-17 giorni. I nidiacei, nidicoli, sono allevati da entrambi i genitori e restano nel nido per 16-21 giorni. Si nutre di invertebrati, (insetti).



Em. Portogallo 9-5-2019 - Ob. Delgada 9-5-2019. ASI 1° G. Serie "Europa - Uccelli Nazionali". Ediz. CCT - Portogallo.



FRINGILLA COELEBS
FRINGUELLO

Ordine - Passeriformi
Famiglia - Fringillidi

Em. Polonia 24-4-2019 - Ob.
Varsavia 24-4-2019. ASI 1° G.
Serie "Europa - Uccelli Naziona-
li". Ediz. Universal - Italia.

Caratteristiche - Lungo circa 15 cm. Il maschio ha la fronte nera, il vertice e la nuca di color grigio blu, il dorso è bianco castano e più in basso verde giallastro. I lati della testa e del collo, la gola e il petto sono rossastri, mentre il sottocoda è biancastro. La femmina presenta le parti superiori color bruno grigio verdastro, quelle inferiori brunastro grige.

Ambiente - Boschi, giardini, parchi, zone coltivate.

Diffusione - Europa, Asia, Africa nordoccidentale.

Vita e abitudini - Costruisce un nido a coppa costruito da muschio e licheni. Depone una o due covate l'anno di 4-5 uova, deposte a intervalli giornalieri. L'incubazione è affidata alla femmina per una durata di 11-13 giorni. I nidiacei, nidicoli, sono allevati da entrambi i genitori e lasciano il nido a 12-13 giorni. Il Fringuello ha un'alimentazione granivora, si nutre anche di invertebrati.

Em. Andorra Francese 3-8-1985 - Ob. Principato d'Andorra
12-5-1986. Serie "Preservazione della natura". Ediz.
Boubée - Parigi.



Tav. 9. Frozone (*Coccothraustes coccothraustes*).

Em. Albania 15-7-1974 - Ob. Tirana 22-11-1979. Serie "Uccelli canori". Ediz. Casavei - Albania.

Vita e abitudini - Il nido consiste in una coppa di ramoscelli, piccole radici e licheni e viene costruita esclusivamente dalla femmina. E' allevata una sola covata di 5 uova (da 2 a 7), incubate per 12-14 giorni dalla femmina. I nidiacei, nidicoli, sono nutriti da entrambi i genitori e volano all'età di 10-14 giorni. Grazie al becco molto robusto i Frosoni spaccano anche i semi dal guscio più duro (è in grado di sviluppare in media una forza di 45 Kg.). Il cibo si compone di bacche, semi, noci, ecc. Di abitudini sedentarie questa specie può compiere degli spostamenti erratici e delle migrazioni locali vere e proprie.

Em. Svezia 29-11-1984 - Ob. Stoccolma 29-11-1984. ASI 1° G. Serie "Francobolli di Natale". Ediz. Istituto Reale di Scienze del Belgio.

COCCOTHRAUSTES COCCOTHRAUSTES FROSONE

Ordine Passeriformi - Famiglia Fringillidi

Caratteristiche - Lungo 17,5 cm. pesa in media 55 grammi. Il becco molto alto e robusto è di color grigio blu, le ali sono nere con una fascia bianca sulle spalle, il groppone e la punta della coda sono bianchi. Le restanti parti superiori sono di color marrone a eccezione della gola che è nera. Le parti inferiori sono di color castano rosa.

Ambiente - Boschi di latifoglie e conifere, parchi e frutteti.

Diffusione - Europa, Asia, Africa nordoccidentale.

141.- *Coccothraustes coccothraustes coccothraustes* (L.)

Gros-bec casse-noyaux — Appelvink

1 ♂ 2 ♀

SERINUS CANARIA (CANARINO)

Ordine Passeriformi - Famiglia Fringillidi



Caratteristiche - Lungo sui 10 cm. I maschi hanno le parti superiori brunoastore con il groppone un pò giallastro, petto giallo, testa giallognola con macchie nerastre. Le femmine presentano una colorazione del piumaggio più uniforme.

Ambiente - Foreste, boschi.

Diffusione - In libertà: Isole Canarie, Madera e Azzorre.

Vita e abitudini - In libertà nidifica sugli alberi. Depone 4-5 uova, incubate dalla femmina per 13-14 giorni. I nidiacei, nidicoli, sono allevati da entrambi i genitori e restano nel nido 18-21 giorni. Si nutre di semi.

Em. Spagna 2-4-2007 - Ob. Madrid 2-4-2007. ASI 1° G. Serie "Flora e Fauna". Ediz. Asena - Madrid.

CARDUELIS CHLORIS

VERDONE

Ordine Passeriformi - Famiglia Fringillidi

Caratteristiche - Lungo sui 14-15 cm. La colorazione delle parti superiori è verde oliva brunoastore con più giallo sul groppone. Le parti inferiori sono verdi giallastre con sfumature grigiastre. Sulle ali e sulle timoniere è presente del giallo.

Ambiente - Boschi, giardini, parchi, frutteti.

Diffusione - Europa, Asia, Africa nord-occidentale.

Vita e abitudini - Nidifica sugli alberi, nelle siepi, dove costruisce un nido grossolano. Depone 4-6 uova, incubate dalla femmina per un periodo di 13-14 giorni. I nidiacei, nidicoli, restano nel nido per 13-16 giorni. I giovani sono allevati da entrambi i genitori e alimentati con cibo rigurgitato. Si nutre di semi, mori, germogli di alberi da frutta, anche una dieta insettivora.

Em. San Marino 30-6-1972 - Ob. San Marino 30-6-1972. 1° G. Serie "Uccelli". Ediz. Privata - Svizzera.





191. — *Monticola saxatilis* (L.) $\frac{2}{5}$
 Monticole de roche — Rotsmerel
 1 ♂ 2 ♀

OENANTHE HISPANICA MONACHELLA

Ordine Passeriformi - Famiglia Turdidi

Caratteristiche - Lunga sui 14,5 cm. Il maschio ha una colorazione fulvo dorata pallida superiormente con macchia nera su occhi e guance, gola bianchiccia oppur gola e faccia nere. La femmina presenta una colorazione più smorta senza le macchie nere sulla faccia.

Ambiente - Zone aride, rocciose, pascoli.

Diffusione - Europa meridionale, Africa, Asia minore e vicino Oriente.

Vita e abitudini - Nidifica al livello del suolo. Depone due covate di 4-5 uova, incubate dalla femmina. Si nutre di insetti, invertebrati.

Em. San Marino 30-6-1972. Ob. San Marino 30-6-1972. 1° G. Serie "Uccelli". Ediz. Fabrication Suisse.

MONTICOLA SAXATILIS CODIROSSONE

Ordine Passeriformi - Famiglia Turdidi

Caratteristiche - Misura 19 cm. di lunghezza e pesa circa 65 gr. Il maschio nell'abito nuziale ha il capo e il dorso di color grigio blu, il groppone è bianco e le parti inferiori sono di color rosso mattone.

Ambiente - Terreni erbosi e rocciosi di colline e montagne.

Diffusione - Africa nordoccidentale, Europa meridionale.

Vita e abitudini - Il nido viene posto fra le cavità delle rocce o sul terreno. Depone una sola covata all'anno, di 4-5 uova. Si nutre di insetti, invertebrati vari, lucertole, anfibi, e di bacche.

Em. Svizzera 8-5-2008. Ob. Sempach 8-5-2008. ASI 1° G. Serie "Uccelli". Ediz. Museo di Scienze Naturali - Belgio.



44. — Rossignol philomèle
Luscinia megarhynchos megarhynchos Brehm



Vita e Abitudini - Il nido viene costruito tra il folto della vegetazione spesso in prossimità dell'acqua. L'unica covata annuale è composta da 4-5 uova incubate dalla femmina per 13-14 giorni. L'usignolo si nutre soprattutto di insetti, larve e invertebrati di piccole dimensioni, anche di bacche.

Em. San Marino 28-1-1960. Ob. San Marino 28-1-1960. 1° G. Serie "Uccelli". Ediz. Fingerie & Co - Germania.

LUSCINIA MEGARYNCHOS USIGNOLO

Ordine Passeriformi - Famiglia Turdidi

Caratteristiche - Lungo 16 cm. pesa in media 23 grammi. Il piumaggio delle parti superiori è di color marrone con sfumature rossicce sulla coda e il groppone; le parti inferiori sono bianche con sfumature fulve.

Ambiente - Vive nei boschi di latifoglie, campagne alberate e con cespugli.

Diffusione - Africa nordoccidentale, Europa, Asia occidentale.

EM. Monaco 12-12-1962. Ob. Monaco 12-12-1962. ASI 1° G. Serie "Protezione degli uccelli". Ediz. Museo di Storia Naturale - Belgio.



**MONTICOLA SOLITARIUS****PASSERO SOLITARIO**

Ordine Passeriformi
Famiglia Turdidi

Em. Gibilterra 1988. Ob. Gibraltar
3-8-1988. Serie "Uccelli". Ediz.
O. Badan - Gibilterra.

Caratteristiche - Lungo sui 20 cm. pesa in media 65 gr. Il maschio è completamente di color grigio blu e diventa nerastro d'inverno. La femmina è di color grigio bruno con barrature più chiare ed è quasi simile ai giovani. Presenta becco lungo e sottile, coda corta.

Ambiente - Regioni rocciose, coste rocciose del mare, macchia mediterranea.

Diffusione - Africa settentrionale, Europa meridionale, Asia.

Vita e abitudini - Di solito non frequenta montagne troppo elevate. Il nido, una coppa di muschio ed erbe, viene posta nelle cavità delle rocce, delle scogliere, ed è costruito dalla femmina; Ogni anno è allevata una sola covata di 4-5 uova, incubate dalla femmina per 12-13 giorni. I nidiacei nidicoli, sono nutriti da entrambi i genitori e volano a circa 17 giorni di età. Si nutre prevalentemente di insetti e aracnidi, ma anche di lucertole e bacche in autunno.

Em. Gibilterra 29-10-1960. Ob. Gibraltar 1-8-1962. Serie "Uccelli". Ediz. Museo di Storia Naturale - Belgio.





Em. Repubblica Federale Tedesca 4-10-1957. Ob. Bad Waldsee 29-1-1958. ASI. Serie "Protezione della Fauna". Ediz. Kunstverlag Fingerle - Germania.

Vita e abitudini - La femmina costruisce il nido fra gli arbusti. Depone 3-6 covate all'anno di 5-6 uova, incubate dalla femmina per 12-15 giorni. I nidiacei, nidicoli, nutriti da entrambi i genitori volano all'età di 12-15 giorni. Il Pettirosso si nutre di insetti, invertebrati, bacche e semi. I pettirossi mostrano uno spiccato comportamento territoriale anche fuori dal periodo della riproduzione.

ERITHACUS RUBECULA

PETTIROSSO

Ordine Passeriformi - Famiglia Turdidi

Caratteristiche - Lungo 13,5 cm. pesa in media 16 grammi. I sessi sono simili e presentano le parti superiori di color verde oliva, il petto di color arancione e il ventre bianco. I giovani sono di color bruno con macchie e striature rossicce e fulve.

Ambiente - Boschi, parchi, campagne alberate con vegetazione arbustiva.

Diffusione - Europa, Asia minore.



Em. Gran Bretagna 30-10-1995. Ob. Edimburgo 1-4-1996. Serie "Pettirossi di Natale". Ediz. Privata.



SAXICOLA TORQUATA

SALTIMPALO

Ordine Passeriformi
Famiglia TurdidiEm. Belgio 24-12-1990. Ob.
Bruxelles 14-6-1991. Serie "Uccelli". Ediz. Sempach.

Caratteristiche - Lungo sui 12,5 cm. Il maschio presenta la colorazione del piumaggio molto caratteristica: testa nera, un semicollare bianco, fascia alare bianca, groppone bianco con una copertura più o meno accentuata da macchie scure. Le parti inferiori, nel periodo riproduttivo, sono di un castano acceso.

Ambiente - Terreni aperti, zone coltivate

Diffusione - Europa, Asia, Africa

Vita e abitudini - Nidifica sul terreno tra la vegetazione dove costruisce un nido a coppa. Depone 2 covate che sono costituite generalmente da 5-6 uova, incubate dalla femmina per un periodo di 14-15 giorni. I nidiacei, nidicoli, sono allevati dai genitori e restano nel nido per 12-13 giorni. Si nutre prevalentemente di invertebrati (insetti).

Em. Lussemburgo 5-12-1994. Ob. Lussemburgo 5-12-1994. 1° G.
Serie "Uccelli". Ediz. Art Pres - Londra.



TURDUS MIGRATORIUS (ROBIN AMERICANO)
Ordine Passeriformi - Famiglia Turdidi



Wisconsin State Bird

Em. USA 14-4-1982 - Ob. Madison 14-4-1982. ASI 1° G. Serie "Uccelli e fiori degli Stati Uniti d'America". Ediz. Pequot Lakes - Minnesota.

Caratteristiche - Lungo 23-28 cm., apertura alare 31-41 cm. La gola è bianca con striature nere, il capo varia dal nero al grigio, il ventre e sottocoda, copritrici di colore bianco. Il dorso bruno e un petto rosso-arancio.

Ambiente - Terreno agricolo boschivo e più aperto, aree urbane.

Diffusione - Nord America.

Vita e abitudini - Il nido è costruito da erba grossolana, ramoscelli, carta. Depone 3-5 uova, incubate dalla femmina, per circa 14 giorni. I pulcini lasciano il nido due settimane più tardi. Si nutre di invertebrati (larve di coleotteri, lombrichi, bruchi), frutta e bacche.

CHERSOPHILUS DUPONTI (ALLODOLA DUPONT)
Ordine Passeriformi - Famiglia Alaudidi

Caratteristiche - Misura 18 cm. Una robusta allodola, con lungo becco curvo, collo e zampe lunghi, ma senza cresta. Prevalentemente bruno scuro con marcati segni neri. Petto marcatamente striato, parti inferiori bianche. Coda con timoniere esterne bianche.

Ambiente - Pianure aperte, calde e asciutte, macchie di vegetazione.

Diffusione - Vecchio Mondo, America del nord, Australia.

Vita e abitudini - Costruisce un nido a coppa sul terreno. Depone in genere 2-6 uova. L'incubazione dura 11-16 giorni. Si nutre a terra, anche sondando il terreno con semi e invertebrati.



Em. Spagna 1-10-2007 - Ob. Madrid 1-10-2007. ASI 1° G. Serie "Flora e Fauna". Ediz. Asera - Madrid.

LUSCINIA SVECICA (PETTAZZURRO)

Ordine Passeriformi - Famiglia Turdidi



Em. Norvegia 1-4-1982 - Ob. Oslo 1-4-1982. 1° G.
Serie "Uccelli". Ediz. Druck - Svizzera.

Caratteristiche - Misura circa 13 cm. Il maschio presenta le parti superiori di color bruno a eccezione della base della coda di color castano e le parti inferiori di color bianco. La gola e il petto sono blu con una macchia al centro che è rossiccia. La femmina è priva della macchia blu.

Ambiente - Cespuglietti di salice e betulla.

Diffusione - Europa centro settentrionale, Asia settentrionale.

Vita e abitudini - Il nido viene costruito dalla femmina. Depone 5-7 uova, incubate dalla femmina per 14-15 giorni. I nidiacei, nidicoli volano a 14 giorni di età. Si nutre di insetti, piccoli invertebrati, anche di bacche.

TURDUS PHILOMELOS (TORDO BOTTACCIO)

Ordine Passeriformi - Famiglia Turdidi

Caratteristiche - Lungo sui 23 cm. Presenta le parti superiori brunastre, il petto e i fianchi fulvi con macchie nere strette e piccole. La coda è marrone rossiccia, il sottocoda bianco crema.

Ambiente - Boschi, giardini, parchi.

Diffusione - Europa, Asia, Africa settentrionale.

Vita e abitudini - Nidifica sugli alberi. Il nido è a coppa. Depone 2 covate di 4-6 uova, incubate dalla femmina per 11-15 giorni circa. I nidiacei, nidicoli, sono allevati da entrambi i genitori e restano nel nido 12-16 giorni. Si nutre di invertebrati, sostanze vegetali.

Em. Cecoslovacchia 15-12-1972 - Ob. Budejovice 26-5-1976. Serie "Uccelli". Ediz. Jean Zeltner - Ginevra.



PHOENICURUS PHOENICURUS (CODIROSSO)
Ordine Passeriformi - Famiglia Turdidi



Em. Liechtenstein 9-9-2011 - Ob. Vaduz 9-9-2011. ASI 1° G. Serie "Specie avicole native in pericolo di estinzione". Ediz. Nature Pictures - Liechtenstein.

SAXICOLA RUBETRA (STIACCINO)
Ordine Passeriformi - Famiglia Turdidi

Caratteristiche - Lungo sui 12,5 cm., simile al santimpalo, il maschio presenta parti superiori, guance, vertice bruno scuri; le ali e la parte terminale della coda sono quasi nere; una larga barra alare bianca è presente sulle ali. La femmina ha un sopracciglio bianco molto evidente e macchie bianche alla base della coda.

Ambiente - Terreni aperti con vegetazione sparsa, zone palustri.

Diffusione - Europa, Asia occidentale, Africa settentrionale.

Vita e abitudini - Nidifica sul terreno tra la vegetazione in un nido fatto a coppa. Depone una o due covate di 5-7 uova, incubate dalla femmina per 13-14 giorni. Si nutre prevalentemente di invertebrati.



Em. Liechtenstein 9-9-2011 - Ob. Vaduz 9-9-2011. ASI 1° G. Serie "Specie avicole native in pericolo di estinzione". Ediz. Nature Pictures - Liechtenstein.


Caratteristiche - Lungo sui 14 cm. Il maschio presenta un piumaggio caratteristico; la faccia e la gola sono neri, il petto, i fianchi e il groppone rossicci, il vertice e il dorso bluastri; è presente una macchia sopraciliare bianca. Nella femmina le parti superiori sono bruno grigie, quelle inferiori fulvo chiare.

Ambiente - Boschi, parchi, giardini.

Diffusione - Europa, Africa, Asia.

Vita e abitudini - Nidifica in cavità di alberi, muri. Depone 2 covate di 6-7 uova che sono incubate dalla femmina per un periodo di 11-14 giorni. I nidiacei, sono allevati da entrambi i genitori. Si nutre principalmente di invertebrati.

6. — Bergeronnette jaune
Motacilla flava flava L.

**MOTACILLA FLAVA****CITRETTOLA**

Ordine Passeriformi

Famiglia Motacillidi

Caratteristiche - Lunga sui 16 cm. Presenta una variabilità di colorazione del piumaggio secondo le sottospecie. La testa del maschio adulto in piumaggio nuziale è grigio bluastra, sopracciglio bianco, parti superiori verde oliva, parti inferiori gialle.

Ambiente - Praterie umide, zone palustri.

Diffusione - Europa, Asia, Africa, Alaska.

Vita e abitudini - Nidifica sul terreno in depressioni. Depone una o due covate di 5-6 uova, incubate dalla femmina per 12-14 giorni.

Em. Monaco 12-12-1962 - Ob. Monaco 12-12-1962. Serie "Protezione degli uccelli". Ediz. Istituto Scienze Naturali del Belgio.

CYANOCITTA CRISTATA**GHIANDAIA AZZURRA AMERICANA**

Ordine Passeriformi - Famiglia Corvidi

Caratteristiche - La livrea è marrone sul capo e sul dorso, con pennellate nere sul capo; la porzione più distante delle ali è nera e grigia, quella vicina al dorso è in parte blu con punteggiature nere e in parte marrone. Lunga circa 35 cm.

Ambiente - Boschi in particolare di querce.

Diffusione - Europa occidentale, Giappone, Sud-Est asiatico, Messico, Nord America.

Vita e abitudini - Costruisce il nido tra gli alberi. Depone 5-7 uova, incubate dalla femmina per 2-3 settimane. I giovani lasciano il nido dopo 3-4 settimane. Si nutre di ghiande, semi, frutti, piccoli invertebrati.

Em. USA 6-10-1978 - Ob. Toronto 6-10-1978. Primo Giorno. Serie "Uccelli". Ediz. Nature Press - Usa.





PERISOREUS INFAUSTUS (GHIANDAIA SIBERIANA)
Ordine Passeriformi - Famiglia Corvidi

Caratteristiche - Lunga sui 30 cm. La colorazione del piumaggio è grigio brunastra con la testa più scura. Il becco e le zampe sono scuri.

Ambiente - Foreste di conifere e di betulle.

Diffusione - Europa settentrionale e Asia settentrionale.

Vita e abitudini - Nidifica sugli alberi. Depone una sola covata di 4 uova, incubate dalla femmina per 18-20 giorni. I nidiacei, nidicoli, sono allevati da entrambi i genitori. Abbandonano il nido a 21-24 giorni di età. La ghiandaia siberiana si nutre di bacche e frutti nel periodo invernale e di invertebrati in primavera.

Em. Finlandia 15-1-2003 - Ob. Helsinki 15-1-2003. ASI 1°
G. Serie "Uccelli". Ediz. Markus Varesvuo - Finlandia.

PICA PICA (GAZZA)

Ordine Passeriformi - Famiglia Corvidi

Caratteristiche - Lunga sui 46 cm. (la coda è lunga sui 23 cm.), presenta una colorazione del piumaggio bianco e nero con riflessi verdastri. La coda è lunga e graduata, il becco e le zampe sono neri. In volo è molto caratteristica: da sopra è nera con scapolari e la parte centrale delle remiganti primarie bianca, da sotto il ventre e le estremità delle ali bianche.

Ambiente - Zone aperte, coltivi, boschetti.

Diffusione - Europa, Asia, Africa settentrionale, America settentrionale.

Vita e abitudini - Costruisce un rozzo nido fatto di stecchi e sostanze vegetali. Depone una sola covata di 5-8 uova, che sono incubate dalla femmina per un periodo di 17-18 giorni. I nidiacei, nidicoli, sono allevati da entrambi i genitori e restano nel nido per 22-28 giorni. La gazza si nutre soprattutto di invertebrati (insetti).

Em. Giappone 23-5-1987 - Ob. Karatsu 31-5-1988. Serie "Rimboschimento". Ediz. Conservazione della natura - Lisbona.



CYANOPICA CYANUS (GAZZA AZZURRA)
Ordine Passeriformi - Famiglia Corvidi



Caratteristiche - Lunga 35 cm. circa. Il piumaggio presenta una colorazione nera sulla testa con cappuccio fino alla nuca, ali azzurre con margini interni neri, coda lunga azzurra, parti superiori grigio brunastre.

Ambiente - Boschi, giardini.

Diffusione - Spagna, Portogallo, Mongolia settentrionale.

Vita e abitudini - Nidifica sugli alberi. Depone 5-7 uova, incubate dalla femmina per un periodo di 20 giorni. I nidiacei, sono allevati da entrambi i genitori. Si nutre di semi, insetti e altri piccoli animali.

Em. Spagna 3-7-1973 - Ob. Madrid 3-7-1973. 1° G. Serie "Fauna spagnola". Ediz. Privata - Madrid.

GARRULUS GLANDARIUS (GHIANDAIA)
Ordine Passeriformi - Famiglia Corvidi


Caratteristiche - Misura 32 cm. di lunghezza e un peso di 170 grammi. Piumaggio color bruno rosato a eccezione della coda nera, groppone bianco. Le ali presentano le copritrici azzurre con barrature nere.

Ambiente - Boschi di latifoglie e conifere.

Diffusione - Asia, Europa, Africa nordoccidentale.

Vita e abitudini - Il nido consiste in una coppa di ramoscelli imbottita di crini e piccole radici e viene posto sugli alberi.

Ogni anno è allevata una covata di 5-7 uova, incubate da entrambi i sessi per 16-17 giorni. I nidiacei, nidicoli, sono assistiti da entrambi i genitori e volano all'età di 19-20 giorni. Il cibo della Ghiandaia è composto di semi, bacche, noci e ghiande, insetti.



Em. Svizzera 1-12-1969 - Ob. Berna 1-12-1969. ASI 1° G. Serie "Pro Juventute". Ediz. Jean Zeltner - Ginevra.

128. — Etourneau sansonnet
Sturnus vulgaris vulgaris L.



STURNUS VULGARIS (STORNO)

Ordine Passeriformi - Famiglia Sturnidi

Caratteristiche - Lungo sui 21,5 cm. Il piumaggio degli adulti è nerastro con riflessi metallici; durante l'inverno è riccamente macchiettato, biancastro particolarmente nelle femmine. Il becco è giallo d'estate e bruno-grigiastro d'inverno. La sagoma del corpo è compatta con la coda corta.

Ambiente - Boschi, giardini, parchi.

Diffusione - Europa, Asia, Australia, Africa.

Vita e abitudini - Nidifica in cavità degli alberi. Depone 5-7 uova, incubate da entrambi i sessi per circa 12-15 giorni. I nidiacei, nidicoli, sono allevati da entrambi i genitori. Lo stormo presenta un'alimentazione sia animale che vegetale.

Em. Monaco 12-12-1962. Ob. Monaco 12-12-1962. ASI 1° G. Serie "Protezione degli uccelli". Ediz. Museo di Storia Naturale - Belgio.

NUCIFRAGA CARYOCATACIES (NOCCIO- LAIA)

Ordine Passeriformi - Famiglia Corvidi

Caratteristiche - Lunga sui 32 cm. presenta un piumaggio color bruno scuro con numerose macchie bianche, lati della coda e sottocoda sono bianchi. Il becco è robusto e appuntito.

Ambiente - Foreste di conifere, foreste miste.

Diffusione - Europa, Asia.

Vita e abitudini - Nidifica sugli alberi. Depone una sola covata di 3-4 uova, incubate dalla femmina per 17-19 giorni. I nidiacei, nidicoli, sono allevati da entrambi i genitori. La Nocciolaia si nutre principalmente di semi di conifere, nonché di bacche, invertebrati, piccoli uccelli.



Em. Svizzera 4-9-2014. Ob. Goldau 4-9-2014. ASI 1° G. Serie "Animali selvatici". Ediz. Sales Nussbaumer.



PARUS MAJOR

CINCIALLEGRA

Ordine Passeriformi
Famiglia ParidiEm. Albania 31-7-1964 - Ob.
Tirana 21-12-1964. Serie "Uccelli".
Ediz. Jean Zeltner - Ginevra.

Caratteristiche - Lunga sui 14 cm. presenta la testa e la gola nere, le guance bianche, le parti inferiori gialle con una stria nera al centro. Il dorso è verdastro giallastro nella parte superiore e grigiastro al groppone. Le remiganti sono nere con le due primarie esterne orlate di bluastro, le timoniere esterne bianche. Il becco è nero, le zampe blu grigiastre.

Ambiente - Boschi, parchi, giardini.

Diffusione - Europa, Asia, Africa nordoccidentale.

Vita e abitudini - Nidifica nei buchi degli alberi. Depone una covata di 8-13 uova incubate dalla femmina, alimentata dal maschio, per 13-14 giorni circa. I nidiacei, nidicoli, sono allevati da entrambi i genitori, e lasciano il nido a 16-22 giorni e sono indipendenti in 2-4 settimane. La cinciallegra si nutre di invertebrati, semi, bacche, cereali.



极限明信片

Maximum Card

MC1(5-4)

大山雀
Parus major

Em. Repubblica Popolare Cinese
10-9-1982 - Ob. Beijing 10-9-
1982. 1° G. Serie "Uccelli".
Ediz. Maximum Card - Tian
Shiguang.

**PARUS CRISTATUS (CINCIA DAL CIUFFO)**

Ordine Passeriformi - Famiglia Paridi

Caratteristiche - Lunga 11-12 cm. si può facilmente riconoscere per la cresta presente sul vertice e macchiettata di bianco e nero. La faccia è bianca con una striscia nera che da dietro l'occhio scende ricurva, sulla guancia; gola con collare nero. Le parti superiori sono grigio brunastre, quelle inferiori biancastre, con i fianchi un pò fulvi.

Ambiente - Boschi di conifere, boschi misti, parchi.

Diffusione - Europa, Balcani meridionali.

Vita e abitudini - Nidifica nei buchi degli alberi vecchi. Depone generalmente una sola covata di 4-8 uova, che sono incubate dalla femmina, alimentata dal maschio per 13-18 giorni. I nidiacei, nidicoli, sono allevati da entrambi i genitori e restano nel nido 17-21 giorni. La cincia dal ciuffo si nutre di invertebrati e semi particolarmente quelli di conifere.

Em. Portogallo 14-4-2004 - Ob. Castelo Vide 9-8-2004. Serie "Uccelli del Portogallo". Ediz. Deltiologica - Lisbona.

REMIX PENDOLINUS (PENDOLINO)

Ordine Passeriformi - Famiglia Paridi.

Caratteristiche - Lungo sui 10,5 cm. Presenta una colorazione caratteristica con capo e gola biancastre, una macchia nera che attraversa la fronte e l'occhio fino alla zona auricolare. Le parti superiori sono color marrone sul dorso, le ali sono grigio-brune con una zona chiara sulle remiganti.

Ambiente - Boschi presso le rive dei fiumi, zone palustri.

Diffusione - Europa centro meridionale, Asia.

Vita e abitudini - Il nido viene posto sui rami. Depone una sola covata di 6-8 uova, incubate dalla femmina per un periodo di circa 13-14 giorni. I nidiacei, nidicoli, sono allevati da entrambi i genitori e restano nel nido per 16-18 giorni. Si nutre di invertebrati, ma anche di semi.

Em. Albania 31-7-1964 - Ob. Tirana 10-10-1964. Serie "Uccelli albanesi". Ediz. Bocher - Stoccarda.



Die Beutelmäuse - Remix pendulinus (L.)



EMBERIZA CITRINELLA

ZIGOLO GIALLO

Ordine Passeriformi

Famiglia Emberizidi

Em. Germania Repubblica Federale
2-5-2019 - Ob. Essen 9-5-2019.
AST. Serie "Uccelli nazionali".
Ediz. Deutsche Post - Germania.

Caratteristiche - Lungo 16 cm. Il piumaggio delle parti superiori è color bruno con striature più chiare e più scure, il capo e le parti inferiori sono color giallo limone con striature sui fianchi. Le timoniere esterne della coda sono bianche. La femmina presenta colorazione gialla meno estesa e più pallida.

Ambiente - Terreni coltivati, campagne alberate.

Diffusione - Europa e Asia.

Vita e abitudini - Il nido è costruito fra i cespugli delle siepi e fra l'erba alta e folta. Ogni anno sono allevate 2-3 nidiate, ciascuna di 3-5 uova, incubate dalla femmina per 11-14 giorni. I nidiacei, nidicoli, sono nutriti e assistiti da entrambi i genitori e volano all'età di 16 giorni. Si nutre di semi cereali, in minor parte di invertebrati.

Em. Lussemburgo 7-5-2019 - Ob.
Lussemburgo 10-12-2019. Serie
"Uccelli nazionali". Ediz.
Universal - Italia.



EMBERIZA HORTULANA (ORTOLANO)

Ordine Passeriformi - Famiglia Emberizidi

Caratteristiche - Lungo 16 cm. pesa in media 24 grammi. Il maschio ha le parti inferiori di color arancio fulvo. Il capo e il petto color verde oliva. La femmina presenta delle macchie scure sul petto.

Ambiente - Terreni coltivati, campagne.

Diffusione - Europa, Africa e Asia occidentale.

Vita e abitudini - Il nido viene costruito dalla femmina. Le due covate annuali di 4-6 uova incubate dalla femmina. I nidiacei nidicoli sono nutriti da entrambi i genitori. Si nutre di semi, insetti.

Em. Bulgaria 6-10-1999 - Ob. Sofia 6-10-1999. 1° G. Serie "Uccelli canori". Ediz. Bulphila - Sofia.

**ALAUDA ARVENSIS (ALLODOLA)**

Ordine Passeriformi - Famiglia Alaudidi

Caratteristiche - Lungo 18 cm. Presenta le parti superiori brunastre striate di nero; quelle inferiori sono bianco-fulve con larghe strie scure sul petto.

Ambiente - Zone aperte ed erbose, campagne, steppe.

Diffusione - Europa, Asia, Africa nordoccidentale.

Vita e abitudini - Nidifica sul terreno costruendo un nido fatto di erbe secche. Depone due o tre covate di 3-4 uova. L'incubazione è effettuata dalla femmina per 11 giorni. I nidiacei nidicoli sono nutriti da entrambi i genitori. Si nutre di sostanze vegetali: chicchi di grano, germogli, ecc.: in estate è insettivora.

Em. Danimarca 19-6-1986 - Ob. Copenhagen 6-10-1986. Serie "Uccelli". Ediz. Tuck's Post - Inghilterra.



36. — Fauvette à tête noire
Sylvia atricapilla atricapilla (L.)



Em. Monaco 12-12-1962. Ob. Monaco 12-12-1962. ASI 1° G. Serie "Protezione degli Uccelli". Ediz. Museo di Scienze Naturali Monaco.

Vita e abitudini - Il nido viene collocato nei cespugli fitti. Depone 3-6 uova, incubate da entrambi i sessi per 13-15 giorni. I piccoli abbandonano il nido verso l'undicesimo giorno di vita, ma continuano ad essere imbeccati per alcune settimane. La capinera si nutre di insetti, larve, frutta, bacche, granaglie.

SYLVIA ATRICAPILLA

CAPINERA

Ordine Passeriformi - Famiglia Silvidi

Caratteristiche - E' lunga circa 14 cm. Il maschio ha una colorazione grigio cenere chiaro con calotta nera, mentre la femmina è più bruno con calotta rosso ruggine. Il becco e le zampe sono scure. I giovani hanno le parti superiori più fulve e le parti inferiori più giallastre.

Ambiente - Boschi, radure con fitto sottobosco di pruni e rovi, giardini, boscaglie.

Diffusione - Europa, Africa nordoccidentale, Asia Minore, Persia, Palestina.



Em. Albania 15-7-1974. Ob. Tirana 5-11-1975. Serie "Uccelli canori". Ediz. Privata.



Der Drosselrohrfänger - *Acrocephalus arundinaceus* (L.)

Em. Romania 30-5-1966 - Ob. Bucarest 25-6-1966. Serie "Uccelli". Ediz. Wolf Strache - Stuttgart.

Vita e abitudini - Nidifica tra le canne costruendo un nido fatto di sostanze vegetali intrecciate tra loro e sorretto dalle canne stesse. Vi depone una sola covata, costituita generalmente da 4-6 uova che sono incubate per un periodo di 15 giorni da entrambi i sessi. I nidiacei sono allevati da entrambi i genitori e restano circa 12 giorni ancora nel nido. Il cannareccione emette un canto "aspro e prolungato", una varietà di note che suonano come un "karra-karra, krik-krik, gark-gark". Si nutre prevalentemente di insetti e invertebrati vari. In Ungheria è stata osservata una coppia che nutriva i nidiacei anche con piccoli pesci.

ACROCEPHALUS ARUNDINACEUS (CANNARECCIONE)

Ordine Passeriformi - Famiglia Silvidi

Caratteristiche - Lungo sui 18,5 cm. tra le Silvie di palude europee è quello che presenta le maggiori dimensioni, il becco è più lungo e massiccio, e presenta un marcato sovracciglio. La colorazione del piumaggio è marrone scuro superiormente e chiara inferiormente.

Ambiente - Zone palustri, canneti, lungo i fiumi, laghi.

Diffusione - Europa, Africa, Asia.



Der Drosselrohrfänger - *Acrocephalus arundinaceus* (L.)

Em. Benin 1-9-1982 - Ob. Cotonou 1-9-1982. 1° G. Serie "Uccelli". Ediz. Wolf Strache - Stuttgart.



ORIOLOUS ORIOLOUS

RIGOGOLO

Ordine Passeriformi

Famiglia Oriolidi

Em. Liechtenstein 9-9-2011 -
Ob. Vaduz 9-9-2011. ASI 1° G.
Serie "Specie avicole native in
pericolo di estinzione". Ediz.
Carte Maximum - Liechtenstein.


Caratteristiche - Lungo sui 24 cm. Il maschio presenta una colorazione inconfondibile; è giallo brillante, con le ali e la coda nera chiazata di giallo. La femmina è di color verde giallastro, con ali e coda più scura e le parti inferiori con strie scure.

Ambiente - Boschi, foreste, parchi, giardini.

Diffusione - Europa, Asia occidentale e Africa nordoccidentale.

Vita e abitudini - Il nido è costruito dalla femmina è molto caratteristico; è una coppa di sterchi, sostanze vegetali ben sistemati, posto alla biforcazione di due rami orizzontali. Depone 3-4 uova che sono incubate da entrambi i sessi per circa 14-15 giorni. I nidiacei, sono allevati da entrambi i genitori. In generale depone una sola covata. Ha un'alimentazione prettamente insettivora in primavera e frugivora in autunno.

Em. San Marino 28-1-1960 - Ob. San Marino 28-1-1960. ASI 1° G. Serie "Uccelli". Ediz. Fingerle & Co. - Germania.



INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE
KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT VOOR NATUURWETENSCHAPPEN



175. - *Lanius senator senator* L. $\frac{3}{5}$
Pie-grièche à tête rousse — Roodkopklauwier
1. ♂ Adulte - Volwassen — 2. Jeune - Jong

Em. Burundi 30-9-1970 - Ob. Burundi 30-9-1970.
1° G. Serie "Uccelli". Ediz. Istituto Reale
Scienze Naturali del Belgio.

Vita e abitudini - Il nido viene posto sugli alberi e consiste in una coppa di radici ed erbe imbottite con lana, piume e crini. Di solito è allevata una sola nidiata composta da 5-6 uova incubate principalmente dalla femmina per 16 giorni. I nidiacei, nidicoli, sono nutriti da entrambi i genitori e volano all'età di 19-20 giorni. Come le altre averle questa specie cattura le prede dopo averle avvistate da un posatoio. Il cibo è composto soprattutto da insetti (coleotteri, ortotteri, lepidotteri) ma anche da lucertole giovani, uccelli e mammiferi di piccole dimensioni. Nella parata nuziale il maschio si pone di fronte alla femmina, abbassa il capo con le piume rosse e nere gonfie, e le offre del cibo.

Em. Svizzera 28-11-1968 - Ob. Berna 28-11-1968. ASI 1° G. Serie
"Pro Juventute: uccelli locali". Ediz. Istituto Reale Scienze
Naturali del Belgio.

LANIUS SENATOR (AVERLA CAPIROSSA)

Ordine Passeriformi - Famiglia Lanidi

Caratteristiche - Lunga 17 cm. pesa in media 40 grammi. Il capo e la nuca sono di color rossiccio. Le parti superiori sono di color bruno nero a eccezione di due fasce bianche sulle ali e del groppone bianco. Le parti inferiori sono bianche.

Ambiente - Macchia mediterranea, campagne alberate.

Diffusione - Asia occidentale, Africa settentrionale, Europa meridionale e centrale.

INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE
KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT VOOR NATUURWETENSCHAPPEN



175. - *Lanius senator senator* L. $\frac{3}{5}$
Pie-grièche à tête rousse — Roodkopklauwier
1. ♂ Adulte - Volwassen — 2. Jeune - Jong

LANIUS COLLURIO (AVERLA PICCOLA)
Ordine Passeriformi - Famiglia Lanidi



Em. Liechtenstein 9-9-2011 - Ob. Vaduz 9-9-2011. ASI 1° G. Serie "Specie avicole in pericolo di estinzione". Ediz. Carte Maximum - Liechtenstein.

Caratteristiche - Lungo circa 17 cm. Il maschio presenta le parti superiori di color castano, il groppone e il capo grigi con una stria nera che attraversa l'occhio. Le parti inferiori sono bianche, la coda è nera con i lati bianchi.

Ambiente - Campagne coltivate.

Diffusione - Europa, Asia occidentale, Africa.

Vita e abitudini - Il nido viene costruito in un cespuglio o su un albero di piccole dimensioni. Depone una covata di 5-6 uova, incubate dalla femmina per 14-16 giorni. I nidiacei, nidicoli, vengono allevati da entrambi i genitori. Si nutre di invertebrati, insetti, piccoli mammiferi.

SYLVIA CANTILLANS (STERPAZZOLINA)
Ordine Passeriformi - Famiglia Silvidi

Caratteristiche - Lunga sui 12 cm. Presenta una colorazione delle parti superiori grigio cenere, l'addome e il sottocoda sono chiari. La femmina presenta una colorazione più chiara.

Ambiente - Boschi, radure aperte.

Diffusione - Europa, Asia minore, Africa nordoccidentale.

Vita e abitudini - Nidifica tra i cespugli. Depone due covate di 3-4 uova, incubate dalla femmina per 11-12 giorni. I nidiacei, nidicoli, sono alimentati da entrambi i genitori e restano nel nido per 11-12 giorni. Si nutre prevalentemente di invertebrati.

Em. Spagna 4-12-1985 - Ob. El Puerto de Santa Maria 4-12-1985. ASI 1° G. Serie "Uccelli". Ediz. Asema - Madrid.



TICHODROMA MURARIA (PICCHIO MURAILO)
Ordine Passeriformi - Famiglia Sittidi



Em. Svizzera 6-9-2007 - Ob. Sempach 6-9-2007. ASI 1° G. Serie "Uccelli".
Ediz. Jean Zeltner - Ginevra.

MOTACILLA ALBA (BALLERINA BIANCA)
Ordine Passeriformi - Famiglia Motacillidi

Caratteristiche - Lungo 17,5 cm. di cui 9 spettano alla coda. Presenta becco lungo e sottile, zampe lunghe. Le parti superiori sono di color grigio. Le parti inferiori sono bianche e i bordi della coda anch'essi bianchi.

Ambiente - Campagne coltivate, prati e pascoli presso l'acqua.

Diffusione - Europa, Asia, Africa nordoccidentale.

Vita e abitudini - Il nido viene deposto in una cavità delle rocce, degli alberi o degli edifici. Depone 2 covate all'anno di 5-6 uova, incubate dalla femmina per 12-14 giorni. I nidiacei, nidicoli, sono alimentati da entrambi i genitori e volano all'età di 13-16 giorni. La Ballerina bianca si nutre di insetti, piccoli vermi e molluschi.



Em. Islanda 19-3-1986 - Ob. Reykjavik 27-4-1987. Serie "Uccelli". Ediz. Riserva e conservazione della natura - Lisbona.

**CRIMSON CHAT (CREMISI PETTO SUORA)**

Ordine Passeriformi - Famiglia Melipacidi

Caratteristiche - Lungo 10-15 cm. peso 10-11 grammi. I maschi adulti sono coperti di piume marroni, hanno corone rosse e in parti; una maschera nera intorno agli occhi, gola bianca. Le femmine hanno una marcatura più chiara. Gambe lunghe e sottili.

Ambiente - Deserti, climi semi-aridi, boschi.

Diffusione - Parte centrale dell'Australia.

Vita e abitudini - Si nutre di insetti, ragni, che si trovano a terra o in arbusti, con la lingua a spazzola estraggono il nettare o prendere i semi dai fiori.

Em. Australia 9-8-2001 - Ob. Newman Wa 9-8-2001. ASI 1°
G. Serie "Flora e fauna". Ediz. Dave Watts.

PAINTED FIRETAIL (Il Diamante variopinto)

Ordine Passeriformi - Famiglia Estrildidi

Caratteristiche - Misura 10-12 cm. di lunghezza, peso di circa 12 grammi. La zona dorsale, il ventre ed il collo sono di colore bruno, il petto, il ventre ed i fianchi sono neri, con punteggiature bianche su questi ultimi e del petto: attorno alla faccia è presente una mascherina rossa.

Ambiente - Aree secche e semidesertiche con cespugli.

Diffusione - Australia centrale.

Vita e abitudini - Il nido viene costruito nel folto della vegetazione. Depone 3-5 uova, incubate da entrambi i genitori per circa 2 settimane.



Em. Australia 9-8-2001. Ob. Newman Wa 9-8-2001. ASI 1° G. Serie "Flora e fauna". Ediz. Dave Watts.



Em. USA 13-6-1987 - Ob. Toronto 13-6-1987. 1° G. Serie "Animali selvatici Americani". Ediz. Audubon Society - New York.

Vita e abitudini - E' gregaria, escluso il periodo riproduttivo. Nidifica in svariati ambienti presso l'acqua e il aperta campagna. Il nido è costruito da entrambi i sessi e consiste in una sorta di coppa di fango e sostanze vegetali. Depone 2-3 covate di 4-5 uova, incubate dalla femmina per 17-24 giorni. I nidiacei, nidicoli, sono allevati da entrambi i genitori e lasciano il nido all'età di 17-24 giorni. La rondine è divoratrice di insetti che cattura in volo.

Em. Spagna 4-10-2006 - Ob. Madrid 4-10-2006. ASI 1° G. Serie "Flora e fauna". Ediz. Asena - Madrid.


HIRUNDO RUSTICA (RONDINE)

Ordine Passeriformi - Famiglia Irundidi

Caratteristiche - Lunga sui 19 cm. è facilmente riconoscibile per la coda forcuta con le timoniere allungate, le parti superiori del piumaggio di un colore blu scuro metallico, quelle inferiori biancastre con sfumature crema, fronte e gola rossicce, banda blu scura sull'alto petto. Gli individui giovani presentano una colorazione più smorta e le timoniere esterne più corte.

Ambiente - Campagne, zone coltivate presso l'acqua, abitazioni in campagna.

Diffusione - Europa, Asia, Africa, America settentrionale.



REGULUS IGNICAPILLUS (FIORRANCINO)

Ordine Passeriformi - Famiglia Regulidi

Caratteristiche - Lungo circa 10 cm. Sul capo, penne di color arancio vivo, quasi rosso, formano una macchia, delimitata da una sottile banda, nera, seguita da un'altra banda bianca. Le parti superiori del corpo sono grigio-olivastre, sulle ali vi sono due fasce bianche molto nette; ai lati del collo vi è una macchia verde-dorata; le parti inferiori sono bianche-giallognole.

Ambiente - Zone montane.

Diffusione - Italia, Europa centromeridionale, Asia minore, Africa del nord.



Em. San Marino 30-6-1972 - Ob. San Marino 30-6-1972.
1° G. Serie "Uccelli". Ediz. Jean Zeltner - Ginevra.

Vita e abitudini - Costruisce il nido elegante, con muschi, erbe e piume e si appende ai rami. A maggio depone una covata di 9-12 uova, incubate dalla femmina per 13-14 giorni. I nidiacei, nidicoli, sono allevati dai genitori e restano nel nido per 16-21 giorni. Il fioirrancino è arboricolo, vivacissimo, sempre in grande attività, perchè ricerca i piccoli insetti di cui si nutre.

Em. Svizzera 28-11-1968 - Ob. Berna 28-11-1968. ASI 1°
G. Serie "Uccelli". Ediz. Jean Zeltner - Ginevra.



**MUSCIVORA STRIATA****PIGLIAMOSCHE**

Ordine Passeriformi
Famiglia Muscivoridae

Em. Svezia 31-I-1989. Ob. Kiruna 26-8-1994. Serie "Natura".
Ediz. Sempach - Svizzera.

Caratteristiche - Lungo sui 13-14 cm. Presenta le parti superiori di un color bruno grigiastro con striature bruno scure sulla testa; le parti inferiori sono bianco grigiastre con delle rigature brune ai lati della gola, del petto e ai fianchi.


Ambiente - Boschi, giardini, parchi.

Diffusione - Europa, Africa, Asia minore, Iran, India.

Vita e abitudini - Nidifica su di una sporgenza tra la biforcazione di rami, costruisce un nido fatto di muschio, piccole radici, piume. Depone 4-5 uova, incubate prevalentemente dalla femmina, nutrita dal maschio per 11-15 giorni. I nidiacei, nidicoli, lasciano il nido dopo una media di 12-15 giorni e sono nutriti dai genitori per circa 20 giorni. Si nutre di insetti (soprattutto Ditteri, Imenotteri, Coleotteri e Libellule) nonché di vermi e di bacche.

Em. Finlandia 4-12-1952. Ob. Helsinki 22-12-1953. Validità Postale 31-12-1962. Serie Lotta contro la TBC. Ediz. Raphael - Tuck - Inghilterra.





PARASIDEA APODA

UCCELLO DEL PARADISO

Ordine Passeriformi - Famiglia Paradiseidi

Caratteristiche - Ha un piumaggio variopinto con toni del rosso e del giallo, mentre il capo spicca per i colori verdi-gialli. Il maschio raggiunge il metro di lunghezza, ma circa 70 cm. la lunghezza delle penne della coda.

Ambiente - Foreste montane.

Diffusione - Australia, Nuova Guinea.

Vita e abitudini - Il nido viene costruito dalla femmina. Si nutre di frutti maturi, bacche.

Em. Nuova Guinea Olandese 1954. Ob. Hollandia 8-6-1955. Serie "Uccelli". Ediz. Boubée - Parigi.

TROGLODYTES TROGLODYTES

SCRICCILOLO

Ordine Passeriformi - Famiglia Trogloditi

Caratteristiche - Lungo sui 9 cm. Ha una corporatura compatta e arrotondata. La colorazione del piumaggio è brunastra più chiara nelle parti inferiori con numerose barrature scure su ali, fianchi e coda;

Ambiente - Boschi, cespugli, siepi, canneti.

Diffusione - Europa, Asia, Africa nordoccidentale, America settentrionale.

Vita e abitudini - Nidifica tra le siepi. Depone 5-8 uova incubate dalla femmina per 14-17 giorni. Si nutre di insetti, di ragni e piccoli artropodi.

Em. Albania 31-7-1964. Ob. Tirana 10-10-1964. Serie "Uccelli". Ediz. Schöner Bocher - Stuttgart.



Zaunkönig - *Troglodytes troglodytes* L.